



The Chemical Company

TO JE
TO.

 **BASF**
The Chemical Company

Corum[®]

Najjači herbicid
za borbu protiv
korova u soji!



DISTRIBUTER:



VICTORIALOGISTIC

Soju nije lako gajiti. Ona je jedna lepa i nežna biljka. I mnogo sigurnija kada je prihod u pitanju od drugih jakih biljaka, kukuruza i suncokreta koji se lakše gaje, ali nikada ne znamo da li će to biti isplativo.

Najopasniji za soju su korovi. Svaka greška sa herbicidima oštećuje soju i smanjuje joj prinos. To se najbolje vidi kada soju prskamo posle setve, a pre nicanja. Ako se koriste agresivni (najčešće jeftiniji) preparati i padne samo malo više kiše, soja to odmah pokaže. Soja nikne, naraste do prve troliske, požuti i tako ostane dve do tri nedelje. Pati...

A kad soja pati, mi gubimo prinos i zaradu.

Zatim, kada dođe vreme da se soja prska preko lista opasnosti i greške su još veće. Ako se ne pazi kojim preparatima i u kojim dozama se radi, ako se previše čeka da niknu svi korovi (česta greška koja skupo košta), ako se ne pazi na kojim temperaturama prskamo, soju možemo jako da oštetimo, što se najčešće i dešava.

Drugo... korovi koji su najopasniji za soju su: PEPELJUGA, ŠTIR I AMBROZIJA! Njihov porast je najvažnije pratiti. Ostali korovi, kao što su: gorušica, čičak ili tatula, mogu se suzbiti i ako malo pobegnu sa porastom.

Treće... herbicid koji treba koristiti zove se **Corum®**! Ovo je, do sada NAJJAČI herbicid za zaštitu soje od korova!

Četvrto... Zato što soja dugo raste i treba joj vremena da zaklopi redove, treba je prskati

DVA PUTA
SA PO
POLA
DOZE!

... Znači, **Corum®** treba prskati dva puta i to ovako: Prvi put sa pola doze (0,9 litara po hektaru **Corum®** i OBAVEZNO dodati 0,5 lit. okvašivača (leпка) sa imenom **Dash®**) kada nikne oko 20% korova i kada pepeljuga, štir ili ambrozija budu visine od 2-3 cm! Drugi put posle dve-tri nedelje, kada nikne novi talas ovih korova opet sa pola doze **Corum®** - 0,9 Corum-a i 0,5 lit. leпка **Dash®**.

Kada se soja prska preko lista?

Koji su korovi najopasniji za soju?

Šta treba koristiti da bi soju zaštitili od korova?

Koliko puta?

Na koje vremenske prilike (ili ne prilike) treba paziti?

IDEMO REDOM...

Prvo i osnovno pravilo je da **NE TREBA DOZVOLITI korovima da prerastu 2-3 santimetra visine!**

Mnogo je važnije da gledamo korove, nego da soji brojimo troliske!

Šesto... I NAJVAŽNIJE!

Pre prskanja soje NAZOVITE agronome **BASF-a**!

Takođe za savet o primeni pozovite i agronome našeg distributera Victoria Logistic.

Bolje je sto puta proveriti nego jednom pogrešiti!



FORMULACIJA:
koncentrovani rastvor (SL)

AKTIVNE SUPSTANCE:
480 g/l bentazon + 22,4 g/l imazamox

PAKOVANJE: 1L

PROIZVOD: **Corum®** je jedan od najjačih sistemskih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i nekih jednogodišnjih travnih korova u usevu soje.

VREME PRIMENE: Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi od 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

KOLIČINA PRIMENE: Preporuka je da se proizvod **Corum®** koristi dvokratno u količini od 0,9 + 0,9 l/ha uz dodatak okvašivača **Dash®** (1+1 l/ha), ali iskustva iz prakse govore da je dovoljna količina okvašivača **Dash®** od 0,5 + 0,5 l/ha.

SPEKTAR DELOVANJA: Odlično suzbija najopasnije korove za soju, kao što su: abutilon (*Abutilon theophrasti*), ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), štir (*Amaranthus retroflexus*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), tatula (*Datura stramonium*), tušt obični (*Portulaca oleracea*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), kereće grožđe (*Solanum nigrum*) i čičak (*Xanthim struamrium*).